

**Herpetofauna del Parque Natural das Fragas do Eume (A Coruña): distribución,
estado de conservación y amenazas**

PEDRO GALÁN

Departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía, Facultade de
Ciencias, Universidade da Coruña, A Coruña, Spain.

***Basic and Applied Herpetology* 28 (2014) 113-136**

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Figura S1: Diversidad de ambientes en el Parque Natural das Fragas do Eume (A Coruña): (a) Zona de Caaveiro-A Ribeira. Se puede apreciar lo angosto del cañón fluvial que forma este río y lo pronunciado de las laderas, densamente cubiertas de bosque atlántico. También se aprecian las plantaciones de eucaliptos (a la izquierda) que se intercalan entre el bosque natural. (b) Otra zona del cañón fluvial, en Ventureira, donde predomina el bosque atlántico. (c) Río Eume en su cauce bajo. (d) Arroyo lateral al Eume, más importante para la herpetofauna que el propio río Eume, por su menor contaminación y mayor diversidad de microhábitats. (e) Cañón rocoso del Eume, aguas abajo del Embalse. (f) En la parte oriental del Parque existen extensas formaciones de matorrales y pastizales en las zonas altas, quedando el bosque atlántico relegado al fondo de los valles y laderas (Monte dos Penedos, Serrón do Lobo). En estas zonas altas son menos frecuentes algunas de las especies más características del Parque, como *C. lusitanica* o *I. monticola*. Fotos: Pedro Galán.




Figura S2: Cuatro de las especies de herpetos más representativas del Parque Natural das Fragas do Eume, por la abundancia de sus poblaciones o la singularidad de éstas: (a) *Chioglossa lusitanica*. (b) *Rana iberica*. (c) *Iberolacerta monticola*. (d) *Lacerta schreiberi*. Todas ellas, menos *L. schreiberi*, están catalogadas como vulnerables por la legislación gallega. Fotos: Pedro Galán.




Figura S3: Impacto de los incendios en el Parque Natural das Fragas do Eume: (a) Vista general de la principal zona quemada en el incendio de la primavera de 2012 (Caaveiro, O Coto, A Ribeira, Ventureira, etc.). El color marrón corresponde a los árboles quemados, mayoritariamente eucaliptos (que también aparecen en el primer plano de la foto). Se puede apreciar como éstos se entrelazan con el bosque atlántico, que también resultó afectado, así como importantes zonas del suelo forestal. El incendio se originó en la zona alta que se ve al fondo a la derecha, propagándose hacia las laderas y partes bajas del cañón fluvial del Eume. (b) Aspecto de una zona de bosque atlántico quemada, un año después del fuego. (c) Zona norte del Parque (A Ribeira, As Neves), por donde se propagó el incendio de marzo-abril de 2012. Se puede ver que las laderas calcinadas estaban casi enteramente cubiertas por eucaliptos, especie que favorece la propagación del fuego. (d) La misma zona, un año después (abril de 2013). Obsérvese el intenso rebrote de los eucaliptos. Fotos: Pedro Galán.

